


1歳のお誕生日までに受ける予防接種がふえました。

# ワクチンデビューは 2か月からです。



赤ちゃんのかかりつけ医に予防接種スケジュールを作ってもらいましょう。



## 0歳で受ける予防接種

### ① ヒブ(インフルエンザ菌b型)、肺炎球菌ワクチン

どちらも髄膜炎予防の予防接種です。生後6か月から髄膜炎がふえます。それまでに3回の接種を終えるために2か月から始めてください。

### ② ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ4種混合ワクチン

従来のジフテリア、破傷風、百日咳の3種混合ワクチンに不活化ポリオワクチンが加わりました。百日咳がふえており、0歳でかかると危険です。

### ③ BCG

結核の予防接種です。まだまだ日本では結核があとをたちません。ぜひ赤ちゃんのうちに予防接種を。赤ちゃんは結核性の髄膜炎にかかることがありますが、現在の医学では結核の薬でなおすことはできません。標準の接種時期が変わり生後5か月から8か月前までに受けることになりました。

### ④ B型肝炎ワクチン

B型肝炎は、まれですが、乳幼児期に感染して慢性肝炎になることがあります。

### ⑤ ロタウイルスワクチン

乳幼児によくある下痢の原因のウイルスのワクチンで飲むワクチンです。ロタウイルス胃腸炎はごくまれに重症化することがあり、重症化を防ぐためのワクチンです。生後6週間からできますが、他のワクチンと同時接種で生後2か月からが原則です。ワクチンの種類により2回のもものと3回のもものがあります。

### ⑥ インフルエンザワクチン

生後6か月から推奨されています。

# 予防接種スケジュールモデル



## 単独接種モデル

月齢のめやす	ワクチンの種類と接種間隔	予約日
2か月	ヒブ	月 日
	↓1週	
	肺炎球菌+ロタ	月 日
	↓4週	
3か月	ヒブ	月 日
	↓1週	
	肺炎球菌+ロタ	月 日
	↓4週	
4か月	ヒブ	月 日
	↓1週	
	肺炎球菌	月 日
	↓1週	
	4種混合	月 日
5か月	↓3週	
	4種混合	月 日
	↓1週	
	BCG+(ロタ)	月 日
6か月	↓4週	
	4種混合	月 日
	↓1週	
7か月	B型肝炎	月 日
	↓16週	
	B型肝炎	月 日



## 同時接種モデル

ワクチンの種類と接種間隔	予約日
ヒブ 肺炎球菌 B型肝炎 ロタ	月 日
↓4週	
ヒブ 肺炎球菌 B型肝炎 ロタ 4種混合	月 日
↓4週	
ヒブ 肺炎球菌 4種混合(ロタ)	月 日
↓4週	
4種混合	月 日
↓4週	
BCG+B型肝炎	月 日

☆ロタウイルスワクチンは単独接種スケジュールでも同時接種が原則です。ロタを単独でやると、危険度の高いヒブや肺炎球菌のワクチン接種が遅れることになるためです。

☆接種間隔は最低限必要な間隔です。なるべく短くして、早くすませるようにしましょう。接種間隔が1週とは、次の週の同じ曜日に接種できるということです。

☆これはひとつのモデルです。実際のスケジュールや順番はかかりつけ医と相談して決めてください。