

予防接種の種類		対象年齢	標準的な接種年齢等	対象年齢				標準的な接種年齢				接種回数	備考			
				2か月	4か月	6か月	8か月	10か月	1歳	3歳	5歳			7歳		
定期	ロタウイルス	1価	生後6～24週	接種開始 生後2か月～15週未満	↓	↓								2回	1回目接種後27日以上の間隔を置いて、24週までに2回経口接種 ※1回目接種は、生後14週6日までに行うこと	
		5価	生後6～32週	接種開始 生後2か月～15週未満	↓	↓	↓								3回	1回目接種後それぞれ27日以上の間隔を置いて、32週までに3回経口接種 ※1回目接種は、生後14週6日までに行うこと
定期	B型肝炎	不活化ワクチン	1歳未満	生後2～9か月未満	↓	↓		↓						初回 2回	1回目接種後27日以上の間隔を置いて2回目接種	
														追加 1回	1回目接種後139日以上の間隔を置いて接種	
定期	小児用肺炎球菌	不活化ワクチン	生後2～60か月 (5歳) 未満	接種開始 生後2～7か月未満 3回目接種後、 60日以上の間隔を置いて 生後12～15か月未満	↓	↓	↓			↓				初回 3回	1回目接種後それぞれ27日以上の間隔を置いて生後12か月までに3回接種 2回目は、生後12か月までに接種。3回目は、生後24か月までに接種。	
														追加 1回		
定期	5種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ) ヒ	不活化ワクチン	1期 生後2～90か月 (7歳6か月) 未満	接種開始 生後2～7か月未満 3回目接種後、 6～18月を経過したら	↓	↓	↓			↓				初回 3回	1回目接種後20～56日までの間隔を置いて2回目接種(3回目も同様)	
														追加 1回		
定期	BCG(結核)	生ワクチン	1歳未満	生後5～8か月未満			↓							1回		
定期	麻しん風しん混合 (MR)	生ワクチン	1期 生後12～24か月(1～2歳) 未満							↓				1回	1歳になったらできるだけ早期に接種	
			2期 5歳以上7歳未満かつ小学校就学前の1年間								↓			1回	小学校就学前の1年間(年長児) 令和8年度の対象者は、令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれの方	
定期	水痘(水ぼうそう)	生ワクチン	生後12～36か月 (1～3歳) 未満	接種開始 生後12～15か月未満 1回目接種後6～12月までの 間隔をおく						↓	↓			2回	(1回目接種後3月以上の間隔)	
任意	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)	生ワクチン	助成対象 1歳～小学校就学前年度の末日まで							↓		↓			1回	1歳になったらできるだけ早期に接種
														(1回)	小学校就学前の1年間(年長児) 2回目接種を日本小児科学会が推奨	
定期	日本脳炎	不活化ワクチン	1期 生後6～90か月 (7歳6か月) 未満	3～4歳未満 4～5歳未満 2回目接種後おおむね1年を 経過した時期						↓	↓	↓		初回 2回	1回目接種後6～28日までの間隔を置いて2回目接種	
														追加 1回	(2回目接種後6月以上の間隔)	